

GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANGKA KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) DI RSUD UNDATA PALU

Ni Made Budiartini¹, Sri Restu Tempali²

^{1,2}Akademi Kebidanan Palu, Sulawesi Tengah

Email Korespondensi Author : kebidanan.palu@gmail.com

ABSTRAK

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram. Dampak BBLR yaitu pertumbuhannya akan lambat, kecenderungan memiliki penampilan intelektual yang lebih rendah dari pada bayi yang berat lahir normal. selain itu bayi berat lahir rendah mengalami gangguan mental dan fisik pada usia tumbuh kembang selanjutnya. Berdasarkan data Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 tercatat bayi yang mengalami BBLR sebanyak 689 bayi dan yang meninggal tercatat 115 bayi. Berdasarkan data yang di peroleh dari RSUD Undata Palu tahun 2012 bayi yang mengalami BBLR tercatat 388 kasus BBLR dari 1390 bayi lahir hidup dan 47 bayi di laporkan meninggal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran faktor - faktor penyebab angka kejadian bayi berat lahir rendah di RSUD Undata Palu. Desain penelitian yang di gunakan adalah deskriptif. Menggunakan data primer dengan alat penunjang kuesioner dan teknik pengambilan sampel secara konsekutif sampling. Jumlah populasi sebanyak 388 orang dan sampel 43 orang. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh responden yang memiliki tingkat pendidikan menengah 21 responden (49%), dasar 15 responden (35%) dan tinggi 7 responden (16%). Responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 25 responden (58%), kurang baik 18 responden (42%). Responden yang sakit melahirkan BBLR sebanyak 5 responden (12%), tidak sakit 38 responden (88%). Responden dengan paritas tertinggi yaitu ibu dengan paritas multipara yaitu 25 responden (58%), primipara 18 responden (18%). Responden dengan umur <20 tahun sebanyak 8 responden (19%), umur ≥ 35 tahun 4 responden (9%), umur 20-35 tahun 31 responden (72%). Pendapatan <885.000 yaitu 30 orang (70%) dan ≥ 885.000 yaitu 13 orang (30%). Dari hasil penelitian dapat di simpulkan kejadian BBLR di RSUD Undata palu sebagian besar di alami oleh ibu dengan pendidikan menengah, ibu dengan pengetahuan yang baik, ibu yang tidak mempunyai penyakit, umur ibu 20-35 tahun, dan ibu dengan pendapatan yang kurang. Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi angka kejadian BBLR untuk mencegah kejadian BBLR perlu di lakukan penyuluhan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya BBLR.

Kata Kunci: faktor-faktor; BBLR